

## Übersicht aktuelle COVID-19 Maßnahmen (22.11.2021)

Maßnahme	Mitarbeiter*in	Arbeitgeber*in	Patientenbesitzer*in
<b>Ausgangsbeschränkung</b> für ALLE (bis 12.12.2021)	Gilt nicht für das Verlassen zu <b>beruflichen Zwecken</b> , Deckung der Grundbedürfnisse, etc.	Gilt nicht für das Verlassen zu <b>beruflichen Zwecken</b> , Deckung der Grundbedürfnisse, etc.	Gilt nicht für die <b>Versorgung von Tieren</b> (veterinärmedizinische Dienstleitungen)
<b>Maskenpflicht - Abstandsregel</b>	<b>FFP2 Maske</b> in allen geschlossenen Räumen verpflichtend;	<b>FFP2 Maske</b> in allen geschlossenen Räumen verpflichtend;	<b>FFP2-Maskenpflicht; 2-Meter Abstandspflicht</b> zwischen Personen die nicht im selben Haushalt leben
<b>Tierarztpraxen/Tierkliniken</b>	Es gilt die <b>3G-Regel</b> :  <b>Geimpft, Genesen oder Getestet</b> (PCR-Test 72 Stunden; Antigentest einer befugte Stelle 24 Stunden gültig)  <u>Wien</u> : Gültigkeit PCR-Tests 48 Stunden, Antigentests 24 Stunden  <b>3G-Nachweis ist mitzuführen, Kontrolle durch den Arbeitgeber möglich</b>	Es gilt die <b>3G-Regel</b> :  <b>Geimpft, Genesen oder Getestet</b> (PCR-Test 72 Stunden; Antigentest einer befugte Stelle 24 Stunden gültig)  <u>Wien</u> : Gültigkeit PCR-Tests 48 Stunden, Antigentests 24 Stunden	
<b>Gültigkeit der Impfung</b>	<b>Bis 360 Tage</b> nach der Zweitimpfung oder <b>Bis zu 270 Tage</b> nach der Impfung, bei Impfstoffen bei denen nur eine Impfung vorgesehen ist.		
<b>Gültigkeit des Genesungsnachweises/ Absonderungsbescheides</b>	<b>Bis 180 Tage</b> nach Genesungsnachweis/Absonderungsbescheid ->Nach Ablauf der Frist ist zur Erfüllung der 3G-Regel eine Impfung oder regelmäßige Testung erforderlich.		
<b>Weitere von der ÖTK empfohlene Maßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Beschränkung der Anzahl von Patientenbesitzern*innen/Begleitpersonen</b> im <b>Wartezimmer</b> und bei Behandlung - zB. nur 1 Begleitperson - natürlich auch in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten.</li> <li>2. <b>Terminvoranmeldung</b></li> <li>3. <b>Abstandsregeln</b> beachten, <b>Händeschütteln</b> vermeiden und <b>regelmäßig desinfizieren</b>.</li> <li>4. <b>COVID 19 Schutzimpfung</b> - Boosterimpfung bereits und nach 4 Monaten (bzw. je nach Impfstoff)!</li> <li>5. <b>Regelmäßige Antigen u. PCR-Tests</b> auch bei geimpften Personen!</li> </ol>		