

LEBEN HEISST BEWEGEN – ARTHROSE BEI JUNGEN HUNDEN

Ursachen, Management und Besitzerberatung mit Dr. Sabine Mai

Einladung zum kostenlosen Webinar
für Tierärztinnen und Tierärzte

ATF-STUNDE UND
BILDUNGSSTUNDE
ÖTK BEANTRAGT

LIVE-WEBINAR 15.04.2020 um 19:30 Uhr

Referentin: Dr. Sabine Mai, MSc., MAS, Fachtierärztin für Physiotherapie
und Rehabilitation, Certified Canine Rehabilitation Practitioner, Gföhl, Österreich



Leben heißt bewegen – Arthrose bei jungen Hunden. Ursachen, Management und Besitzerberatung

Wer „Arthrose“ hört, denkt automatisch zuerst an die Senioren unter den Hunden. Die verbesserten Zuchtuntersuchungen sagen jedoch schon ganz jungen Hunden die Entwicklung einer oder auch mehrerer Arthrosen voraus. In diesem Webinar beleuchtet Dr. Sabine Mai typische Präsentationen von Arthrose-Hunden, die den Großteil Ihres Lebens noch vor sich haben, erläutert Ursachen, Konzepte für multimodales Management und gibt Tipps zur Besitzerberatung.

Teilnahmegebühr: keine

ANMELDUNG UNTER <https://reg.ubivent.com/start/elanco>

Bereits registrierte Nutzer müssen sich nicht erneut registrieren. Auf der Webinar-Plattform können alle Webinare noch 1 Jahr nach dem Live-Event absolviert werden. Bei Fragen zur Registrierung wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Arndt, Ubivent Tel.: +49 621 586796-70

Galliprant® 20 mg Tabletten für Hunde, Galliprant® 60 mg Tabletten für Hunde, Galliprant® 100 mg Tabletten für Hunde. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Andere anti-inflammatorische und antirheumatische Mittel, nicht steroidale. **Zusammensetzung:** Eine Tablette enthält: Wirkstoff: Grapiprant 20 mg, Grapiprant 60 mg, Grapiprant 100 mg. **Anwendungsgebiet(e):** Zur Behandlung von Schmerzen im Zusammenhang mit leichter bis mittelschwerer Osteoarthritis bei Hunden. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden bei trächtigen oder laktierenden Tieren sowie Zuchttieren. **Nebenwirkungen:** In klinischen Studien wurden die folgenden leichten und im Allgemeinen vorübergehenden Nebenwirkungen beobachtet: Erbrechen, weich geformter Kot, Diarrhoe und Inappetenz. Erbrechen wurde sehr häufig beobachtet, während weich geformter Kot, Diarrhoe und Inappetenz häufig beobachtet wurden. In sehr seltenen Fällen wurden nach der Zulassung in den USA Hämatemesis oder hämorrhagische Diarrhoe nach klinischer Anwendung berichtet. **DE: Verschreibungspflichtig. AT: Rezept- und apothekenpflichtig.** Informationen über Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen, Trächtigkeit und Laktation sind der Fachinformation zu entnehmen. **Pharmazeutischer Unternehmer:** Elanco Deutschland GmbH, Werner-Reimers-Str. 2-4, D-61352 Bad Homburg